GlauQoL-17

Palavras Chave	Tipo de Instrumento	Autores Originais
Qualidade de vida Glaucoma	Específicos de condição de saúde Específicos de população	Zanlonghi, X. Robin, C.; Arnould, B. Bresson, H. Brouquet, Y. Benmedjahed, K. Bensaid, P.

Título Original	**GlauQoL-17 (Glaucoma Quality of Life Questionnaire – 17)**
Objectivo	Avaliar o impacto do glaucoma, ou do seu tratamento, no dia-a-dia dos doentes.
Condição de Saúde	Glaucoma
População	Adultos
Modo de Preenchimento	Questionário preenchido pelo próprio indivíduo ou por terceiros
Principais referências bibliográficas da v. original	Zanlonghi, X., Robin, C., Arnould, B., Bresson, H., Brouquet, Y., Benmedjahed, K., & Bensaïd, P. (2003). Glaucome et qualité de vie. J. Fr. Ophtalmol., 26(1). Yves Brouquet, Benoît Arnould, Ana Bassols, & Khadra Benmedjahed. (2002). Quality of Life and Glaucoma in Daily Medical Practice: Presentation of the Glauqol-17(Short Form). *Quality of Life Research*, *11*(7), 700–700. http://www.jstor.org/stable/4037939

Versão: Portugal

Nome da	Questionário de Avaliação da Qualidade de Vida em doentes com

Versão

Glaucoma

Autores da versão

Pedro Lopes Ferreira
Diana Ramos

Versão em português

Condições de utilização

Este questionário é distribuido pelo MAPI Research Trust.
O acesso ao questionário é através da plataforma eProvide, seguindo o tutorial disponível aqui.

Número de itens

17

Janela de medida

Hoje

Tempo de preenchimento

5 a 10 minutos

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Ansiedade	P1, P2, P3	0 a 3 ou 0 a 4, com opção de "não aplicável" em alguns itens
Imagem de si	P4, P5	
Estado psicológico	P6, P7	
Vida quotidiana	P8, P9, P10, P11	
Condução	P12, P13	
Limitações	P14, P15	
Controlo da situação	P16, P17	

Sistema de Pontuação

A pontuação é obtida pela soma das respostas aos itens de cada dimensão, a dividir pelo número de itens. Posteriormente a pontuação é convertida numa escala de 0 a 100, onde valores maiores significam melhor qualidade de vida.

Processo de tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, obtenção de uma versão de consenso, retroversão e revisão por especialistas
Coerência interna (Alfa de Cronbach): de 0,40 ("controlo da situação") a 0,84 ("estado psicológico").

Indicadores de Qualidade

Reprodutibilidade (teste-reteste): de 0,53 ("Imagem de si") a 0,91 ("limitações").
Validade de conteúdo: Assegurada com a apreciação de dois oftalmologistas especialistas em glaucoma, e por doentes.
Validade de construção: Medida pela relação entre a pontuação média das dimensões do GlauQoL-17 com algumas variáveis. As mulheres apresentaram menor qualidade de vida, em comparação com os homens, nas dimensões "estado psicológico", "condução" e "limitações". Verificou-se uma maior tendência de os mais idosos demonstram pior qualidade de vida, com significância estatística na dimensão "imagem de si". Os doentes que moravam sozinhos apresentaram uma tendência para melhor qualidade de vida, com significância estatística na dimensão "ansiedade". As dimensões "ansiedade", "estado psicológico", "vida quotidiana", "condução" e "limitações" mostraram diferenças estatisticamente significativas entre a qualidade de vida e os diferentes níveis de gravidade de glaucoma.
Validade de Critério: Correlação fraca entre todas as dimensões do GlauQoL-17 e o índice do EQ-5D (r entre 0,166 e 0,397), exceto com as dimensões "imagem de si" e "controlo de situação". Correlação fraca entre todas as dimensões do GlauQoL-17 e o índice do VAS (r entre 0,199 e 0,402). Validade convergente demonstrada pela comparação das dimensões do GlauQoL-17 e do VFQ-25, com a maioria das dimensões correlacionadas.

Principais referências bibliográficas

Ramos, DA. *Qualidade de Vida dos doentes com Glaucoma.* [Dissertação]. Coimbra: Mestrado em Gestão e Economia da Saúde, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; 2018.