# mMIDAS

| Palavras Chave | Tipo de Instrumento | Autores Originais |
|---|---|---|
| Qualidade de vida<br>Incapacidade<br>Enxaqueca<br>Dor de cabeça<br>Produtividade | Específicos de condição de saúde | RB Lipton<br>J Sawyer<br>WF Stewart |

| | |
|---|---|
| **Título Original** | **mMIDAS (Migraine Disability Assessment Scale (modified))** |
| **Objectivo** | Medir a incapacidade relacionada com a dor de cabeça |
| **Condição de Saúde** | Dor de cabeça; Enxaqueca |
| **População** | Adultos |
| **Modo de Preenchimento** | Preenchido pelo próprio |
| **Principais referências bibliográficas da v. original** | Stewart WF, Lipton RB, Kolodner KB, Sawyer J, Lee C, Liberman JN. Validity of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) score in comparison to a diary-based measure in a population sample of migraine sufferers. Pain 2000;88:41-52<br>Stewart WF, Lipton RB, Whyte J, Dowson A, Kolodner K, Liberman JN, Sawyer J. An international study to assess reliability of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) score. Neurology 1999; 53:988-94<br>Stewart WF, Lipton RB, Kolodner K, Liberman J, Sawyer J. Reliability of the migraine disability assessment score in a population-based sample of headache sufferers. Cephalalgia 1999; 19:107-1 |

## Versão: Portugal

**Nome da versão**

Escala de Avaliação de Incapacidade da Enxaqueca (modificada)

**Autores da versão**

CEISUC CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Pedro Lopes Ferreira
Isabel Luzeiro
Margarida Lopes
André Jorge
Bruno Silva
Lara Ferreira

**Condições de utilização**

Submeter um pedido aqui.

**Número de itens**

7

**Janela de medida**

4 semanas

**Tempo de preenchimento**

Não reportado

**Descrição**

| DIMENSÕES | ITENS | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| Trabalho e educação | P1, P2 | Número de dias |
| Trabalho doméstico | P3, P4 | |
| Atividades familiares, sociais e de lazer | P5 | |

**Sistema de Pontuação**

O mMIDAS apresenta mais duas questões adicionais sobre a frequência de dor de cabeça (mMIDAS6) no último mês e a sua intensidade (mMIDAS7), de 0 (nenhuma dor) a 10 (máxima dor). Estas duas perguntas não entram nos cálculos da pontuação final.
Este cálculo é feito com a soma das cinco primeiras respostas, e a pontuação total pode indicar vários níveis de incapacidade: nenhuma ou pouca (pontuação entre 0 e 5), leve (pontuação entre 6 e 10), moderada (pontuação entre 11 e 20) e severa (pontuação superior a 21).

**Processo de tradução:** equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão e obtenção de uma versão de consenso.
**Alfa de Cronbach:** 0.793
**Reprodutibilidade:** ICC=0.903

| | |
|---|---|
| **Indicadores de Qualidade** | **Validade de conteúdo:** análise de compreensão e aceitação por parte de dois neurologistas, e dez doentes.<br>**Validade de constructo:** A análise fatorial exploratória garantiu a unidimensionalidade da escala, sendo que este fator explica 55,6% da variância. Compararam-se as pontuações do questionário com algumas varáveis sociodemográficas. As variáveis idade, género e educação não demonstraram diferenças estatisticamente significativas. A única diferença foi verificada em doentes solteiros, que tendem a ter um maior impacto da sua dor cabeça, a comparação com doentes não solteiros.<br>**Validade de critério:** o questionário foi comparado com o número de dias com enxaqueca (mMIDAS6), resultando numa correlação de r=0.793; e com a intensidade das enxaquecas (mMIDAS7), com uma correlação de r=0.300. A correlação do mMIDAS-P com o EQ-5D-5L foi negativa e significativa, r(index)=-0.474 e r(EVA)=.0.442; e positiva e significativa com o HADS, r=0.568. |
| **Principais referências bibliográficas** | Ferreira, P. L., Luzeiro, I., Lopes, M., Jorge, A., Silva, B., Ferreira, L. Validity and reliability of the Portuguese version of the modified Migraine Disability Assessment. *BMC Neurology*. 2021. 21:58. https://doi.org/10.1186/s12883-021-02085-z |