

BASDAI

Palavras Chave

Espondilite anquilosante
Coluna
Dor
Fadiga
Rigidez
Qualidade de vida

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

Autores Originais

[Andrei Calin](#)

Título Original **BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)**

Objectivo Medir e avaliar atividade da espondilite anquilosante e a gravidade dos sintomas fadiga e rigidez.

Condição de Saúde Espondilite anquilosante

População Adultos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original [Garret S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. *J Rheumatol.* 1994; 21\(12\): 2286-91.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão Índice de atividade de Bath para a espondilite anquilosante

Autores da versão



Fernando Pimentel Santos
Pedro Lopes Ferreira
Jaime Cunha Branco



Condições de utilização Livre

Número de itens 6

Janela de medida Última semana

Tempo de preenchimento 2 minutos

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Dor na coluna	P1	0 a 10
Dor nas articulações periféricas	P2	
Desconforto ao toque	P3	
Rigidez matinal	P4	
	P5, P6	

Sistema de Pontuação

A pontuação total é expressa numa escala de orientação negativa de ausência de sintomas (0) a sintomatologia muito grave (10).

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Indicadores de Qualidade
ESTADO DA VERSÃO PORTUGUESA

- ✓ Tradução e adaptação
- ✓ Fiabilidade e validade
- ✗ Poder de resposta e significância clínica
- ✗ Normas

Principais referências bibliográficas

Pimentel-Santos F, Pinto L, Barcelos A, Cunha I, Branco J, Ferreira PL. Portuguese version of the bath indices for ankylosing spondylitis patients: a cross-cultural adaptation and validation. *Clinical Rheumatology* 2012; 31(2):341–6.