

GPM

Palavras Chave

Dor
Impacto da dor
Idosos

Tipo de Instrumento

Específicos de sinais e sintomas

Autores Originais

Bruce Ferrell
Wendy Stein
John Beck

Título Original GPM (Geriatric Pain Measure)

Objectivo Medir e avaliar o impacto da dor na funcionalidade e qualidade de vida do idoso.

Condição de Saúde Qualquer condição de saúde

População Idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente ou por entrevista

Principais referências bibliográficas da v. original [Ferrel, BA, Stein, WM, Beck, JC. The Geriatric Pain Measure: Validity, Reability and Factor Analysis. JAGS, 2000; 48:1669-73.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão Medida da Dor em Geriatria

Autores da versão



Teresa Saiote
José Pascoalinho
Pedro Lopes Ferreira
João Gil



Condições de utilização Submeter um pedido [aqui](#).

Número de itens 24

Janela de medida Hoje ou últimos 7 dias

Tempo de preenchimento 5-12 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Intensidade da dor	P17; P21-23; P19-20	---
Descomprometimento	P9-12; P15; P18; P24	---
Dor na deambulação	P4-7	---
Dor com atividades vigorosas	P1-3	---
Dor noutras atividades	P8; P13-16	---

Sistema de Pontuação

A pontuação é obtida pelo somatório das pontuações dos itens numa escala de orientação negativa de sem dor (0) a pior dor (42). A pontuação poderá ser ajustada para uma escala de 0-100.

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 12 idosos. Estudo de validação em curso.

Principais referências bibliográficas

Saiote T. Adaptação da geriatric pain measure (GPM) para a cultura portuguesa, [Monografia]. Alcoitão: Escola Superior de Saúde do Alcoitão; 2012. <http://hdl.handle.net/10400.26/6659>