KHQ

Palavras Chave	Tipo de Instrumento	Autores Originais
Qualidade de vida Incontinência urinária Problemas urinários	Específicos de condição de saúde Específicos de sinais e sintomas	Con Kelleher Linda Cardozo Vikram Khullar Stefano Salvatore

Título Original **KHQ (King's Health Questionnaire)**

Objectivo Medir o impacto da incontinência urinária no estado de saúde e qualidade de vida. Medir o impacto dos cuidados de saúde realizados por problemas urinários.

Condição de Saúde Incontinência urinária

População Adultos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original Kelleher, CJ, Cardozo, LD, Khullar, V, and Salvatore, S. A new questionnaire to assess the quality of life of urinary incontinent women. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 1997; 104, 1374-79.

Versão: Portugal

Nome da versão Questionário de Saúde (Versão portuguesa do King's Health Questionnaire)

Autores da versão

CEISUC CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Carla Gabriel
António Lopes
Pedro Lopes Ferreira
Rui Gonçalves

Condições de utilização Este questionário é distribuido pelo MAPI Research Trust.
O acesso ao questionário é através da plataforma eProvide, seguindo o tutorial disponível aqui.

Número de itens 32

Janela de medida Hoje

Tempo de preenchimento 5 - 20 minutos

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Impacto da incontinência	P2	1 a 4
Limitações de desempenho	P3a-b	1 a 4
Limitações físicas	P4a-b	1 a 4
Limitações sociais	P4c-d; P5c	1 a 4; 0 a 4
Limitações pessoais	P5a-b	0 a 4
Problemas emocionais	P6a-c	1 a 4
Perturbações do sono/energia	P7a-b	1 a 4
Medidas de gravidade	Pa-e	1 a 4

Sistema de Pontuação

A pontuação para cada dimensão é apresentada numa escala de orientação negativa de melhor estado de saúde (0) a pior estado de saúde (100). É possível ainda obter a pontuação da gravidade dos sintomas urinários a partir de uma escala separada de 11 itens (P3-13) pontuável de melhor (0) a pior (33).

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.
Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 12 doentes com incontinência urinária.

Principais referências bibliográficas

Processo de adaptação realizado no CEISUC.