

PDI

Palavras Chave

Qualidade de vida
Psoríase
Medida

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

Autores Originais

Andrew Y. Finlay
Suzanne E. Kelly

Título Original PDI (Psoriasis Disability Index)

Objectivo Medir e avaliar aspetos práticos da vida do doente que foram alterados pela presença da doença.

Condição de Saúde Indivíduos com psoríase

População Jovens, adultos e idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original

Finlay A Y, Kelly S E. *Psoriasis - An index of disability*. *Clinical and Experimental Dermatology*, 1987; 12(1): 8-11.
Finlay A Y, Khan GK, Luscombe D K, Salek M S. *Validation of Sickness Impact Profile and Psoriasis Disability Index in psoriasis*. *British Journal of Dermatology*, 1990; 123(6): 751-56.
Kent G, Al-Abadie M. *The Psoriasis Disability Index - further analyses*. *Clinical and Experimental Dermatology*, 1993; 18(5): 414-6.

Versão: Portugal

Nome da versão Índice de incapacidade provocada pela psoríase

Autores da versão



Bárbara Fernandes
Pedro Lopes Ferreira
Américo Figueiredo



Condições de utilização A definir

Número de itens 15

Janela de medida Últimas 4 semanas

Tempo de preenchimento 5 minutos

DIMENSÕES ITENS PONTUAÇÃO

| DIMENSÕES quotidianas | ITENS | PONTUAÇÃO |
|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Trabalho ou escola | P6-P8 / P9- P11 | 0 a 3 |
| Relações pessoais | P12- P13 | 0 a 3 |
| Atividades de lazer | P14- P17 | 0 a 3 |
| Tratamento | P18 | 0 a 3 |

Descrição

Sistema de Pontuação

A pontuação global ou por dimensão é obtida pela soma das pontuações atribuídas a cada resposta. A pontuação global é apresentada numa escala de orientação positiva de 0 (mínima incapacidade) a 45 (máxima incapacidade), ou em percentagem. As questões 6 a 8 e 9 a 11, são alternativas entre si, assim haja ou não, o desempenho de uma atividade (trabalho/escola).

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e revisão por especialista em dermato-venereologia.

Alfa de Cronbach: entre 0,62 (relações pessoais) e 0.86 (PDI global).

Reprodutibilidade (< 4 semanas): r entre 0,75 (trabalho/escola) e 0,89 (PDI global).

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de 8 doentes.

Validade de construção: valores de r entre -0,26 (PDI global) e -0,22 (tratamento), com a EQ-5D; e r=-0,34 (tratamento) com o termómetro EQ-5D. Ainda pelas relações positivas (valores de p entre 0,00 – PDI global e tratamento, e 0,02 – trabalho/escola) com a PASI.

Principais referências bibliográficas

Fernandes B, Ferreira PL, Figueiredo A. Qualidade de vida dos doentes com psoríase. Criação da versão portuguesa do Psoriasis Disability Index. *Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia*. 2012 Jan/Mar; 70(1): 53-62.

Fernandes BC. Qualidade de vida nos doentes com psoríase – Criação da versão Portuguesa do Psoriasis Disability Index. [Dissertação de mestrado]. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 2010.