

PIQ-6

Palavras Chave

Dor
Qualidade de vida
Dor crónica
Impacto

Tipo de Instrumento

Específicos de sinais e sintomas

Autores Originais

Janine Becker
Renee Saris-Baglana
Jakob Bue Bjorner *et al.*

Título Original **PIQ-6 (Pain Impact Questionnaire 6 Items)**

Objectivo

Medir e avaliar a severidade da dor e o seu impacto na qualidade de vida de pacientes com sintomatologia dolorosa crónica. Medir o impacto da dor nas atividades de lazer, no trabalho, bem como no bem-estar emocional.

Condição de Saúde

Doenças, perturbações ou lesões com dor crónica

População

Jovens, adultos e idosos

Modo de Preenchimento

Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original

Becker J, Saris-Baglana RN, Bjorner JB *et al.* *Advances in Pain Measurement: Item response Theory (IRT) based Methods and the Pain Impact Questionnaire (PIQ-6™)*. PPN5. *Value Health*. 2006 May/June; 9(3):A168. doi:10.1016/S1098-3015(10)64824-3
Becker J, Schwartz C, Saris-Baglana RN, Kosinski M, *et al.* (2007) *Using Item Response Theory (IRT) for Developing and Evaluating the Pain Impact Questionnaire (PIQ-6™)*. *Pain Medicine*, 2007; 8(S3):S129-44. doi 10.1111/j.1526-4637.2007.00377.x
Becker J, Saris-Baglana RN, Kosinski M, *et al.* *The Pain Impact Questionnaire (PIQ-6™)*. A User's Guide. Lincoln, RI: QualityMetric Inc.; 2005.

Versão: Portugal

Nome da versão

Questionário sobre o Impacto da Dor

Autores da versão



Liliana Fã
Paula Pacheco
João Gil
Luís Cavalheiro
Rui Gonçalves
Pedro Lopes Ferreira



Condições de utilização

Submeter um pedido [aqui](#).

Número de itens

6

Janela de medida

Últimas 4 semanas

Tempo de preenchimento 3 minutos

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Intensidade da dor	P1	1 a 6
Impacto da dor	P2-6	1 a 5

Sistema de Pontuação

A pontuação para a intensidade da dor resulta do item 1 através de uma escala que varia de 1 (ausência de dor) a 6, (dores muito fortes).
A pontuação global (impacto da dor) é apresentada numa escala de orientação negativa padronizada de 40 a 78 pontos.

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Alfa de Cronbach: de 0,92.

Reprodutibilidade (72 horas): ICC entre 0,82 e 0,94.

Validade de construção: Unidimensionalidade da medida confirmada por análise fatorial (valores próprios = 4,29, 71,6%). A validade é ainda suportada pelas relações obtidas com escala qualitativa da dor ($\rho=0,71$), sub escalas do SF 12 ($r=-0,72$ e $-0,66$) e idade dos doentes ($r=0,27$).

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 12 doentes com dor crónica.

Principais referências bibliográficas

Fã LF. *Adaptação Cultural e Linguística do Pain Impact Questionnaire 6*. [Monografia]. Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra; 2008.

Cavalheiro L, Gil JN, Gonçalves RS, Pacheco MP, Ferreira PL, Fã L. Measuring the pain impact in adults with a chronic pain condition: adaptation and validation of the Pain Impact Questionnaire (PIQ-6) to the Portuguese culture. *Pain Medicine* 2011;10(10): 1538-43. doi [10.1111/j.1526-4637.2011.01222.x](https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2011.01222.x)/abstract