PIQ-6

Palavras Chave

Tipo de Instrumento

Autores Originais

Dor Qualidade de vida Dor crónica Impacto

Específicos de sinais e sintomas

Janine Becker Renee Saris-Baglama Jakob Bue Bjorner et al.

Título Original PIQ-6 (Pain Impact Questionnaire 6 Items)

Medir e avaliar a severidade da dor e o seu impacto na qualidade de vida de pacientes com **Objectivo**

sintomatologia dolorosa crónica. Medir o impacto da dor nas atividades de lazer, no trabalho, bem como

no bem-estar emocional.

Condição de Saúde Doenças, perturbações ou lesões com dor crónica

> População Jovens, adultos e idosos

Modo de Preenchido pelo doente **Preenchimento**

> Becker J, Saris-Baglama RN, Bjorner JB et al. Advances in Pain Measurement: Item response Theory (IRT) based Methods and the Pain Impact Questionnaire (PIQ-6™). PPN5. Value Health. 2006

May/June; 9(3):A168. doi:10.1016/S1098-3015(10)64824-3

Principais referências bibliográficas da v. original

Becker J, Schwartz C, Saris-Baglama RN, Kosinski M, et al. (2007) Using Item Response Theory (IRT) for Developing and Evaluating the Pain Impact Questionnaire (PIQ-6™). Pain Medicine, 2007;

8(S3):S129-44. doi 10.1111/j.1526-4637.2007.00377.x

Becker J, Saris-Baglama RN, Kosinski M, et al. The Pain Impact Questionnaire (PIQ-6™). A User's

Guide. Lincoln, RI: QualityMetric Inc.; 2005.

Versão: Portugal

Nome da versão

Questionário sobre o Impacto da Dor

Autores da versão



Liliana Fã Paula Pacheco João Gil Luís Cavalheiro Rui Gonçalves Pedro Lopes Ferreira



Condições de utilização Submeter um pedido aqui.

Número de itens 6

Janela de medida Últimas 4 semanas

Tempo de preenchimento

3 minutos

Descric	а	n

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Intensidade da dor	P1	1 a 6
Impacto da dor	P2-6	1 a 5

Sistema de Pontuação

A pontuação para a intensidade da dor resulta do item 1 através de uma escala que varia de 1 (ausência de dor) a 6, (dores muito fortes).

A pontuação global (impacto da dor) é apresentada numa escala de orientação negativa padronizada de 40 a 78 pontos.

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Alfa de Cronbach: de 0,92.

Indicadores de Qualidade

Reprodutibilidade (72 horas): ICC entre 0,82 e 0,94.

Validade de construção: Unidimensionalidade da medida confirmada por análise fatorial (valores próprios = 4,29, 71,6%). A validade é ainda suportada pelas relações obtidas com escala qualitativa da dor (rho=0,71), sub escalas do SF 12 (r= -0,72 e -0,66) e idade dos doentes (r= 0,27).

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 12 doentes com dor crónica.

Principais referências bibliográficas

Fã LF. Adaptação Cultural e Linguística do Pain Impact Questionnaire 6. [Monografia]. Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra; 2008.

Cavalheiro L, Gil JN, Gonçalves RS, Pacheco MP, Ferreira PL, Fã L. Measuring the pain impact in adults with a chronic pain condition: adaptation and validation of the Pain Impact Questionnaire (PIQ-6) to the Portuguese culture. *Pain Medicine* 20110Out; 12(10): 1538-43. doi:10.1111/j.1526-4637.2011.01222.x/abstract