

BAS-G

Palavras Chave

Espondilite anquilosante
Qualidade de vida

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

Autores Originais

Andrei Calin

Título Original **BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global score)**

Objectivo Avaliar globalmente a atividade da espondilite anquilosante.

Condição de Saúde Espondilite anquilosante

População Adultos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original [Jones SD, Steiner SL, Calin A. The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global score \(BAS-G\) British Journal of Rheumatology. 1996; 35\(1\): 66-71.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão Avaliação global de Bath para a espondilite anquilosante

Autores da versão

Fernando Pimentel Santos
Pedro Lopes Ferreira
Jaime Cunha Branco

Condições de utilização Livre

Número de itens 2

Janela de medida Última semana / últimos 6 meses

Tempo de preenchimento 1 minuto

	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Descrição	Qualidade de vida na última semana	1	Escala visual analógica
	Qualidade de vida nos últimos 6 meses	2	

Sistema de Pontuação Leitura direta da escala

**Indicadores de
Qualidade**

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Reprodutibilidade (1 semana): $r=0,96$

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 9 doentes com espondilite anquilosante. Não foram registados efeitos de chão ou de teto.

**Principais
referências
bibliográficas**

Pimentel-Santos F, Pinto L, Barcelos A, Cunha I, Branco J, Ferreira PL. Portuguese version of the bath indices for ankylosing spondylitis patients: a cross-cultural adaptation and validation. *Clinical Rheumatology* 2012; 31(2):341–6.