

BAS-G

Palavras Chave

Espondilite anquilosante
Qualidade de vida

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

Autores Originais

Andrei Calin

Título Original

BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global score)

Objectivo

Avaliar globalmente a atividade da espondilite anquilosante.

Condição de Saúde

Espondilite anquilosante

População

Adultos

Modo de Preenchimento

Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original

Jones SD, Steiner SL, Calin A. The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global score (BAS-G) British Journal of Rheumatology. 1996; 35(1): 66-71.

Versão: Portugal

Nome da versão

Avaliação global de Bath para a espondilite anquilosante

Autores da versão



CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO
EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Fernando Pimentel Santos
Pedro Lopes Ferreira
Jaime Cunha Branco



Condições de utilização

Livre

Número de itens

2

Janela de medida

Última semana / últimos 6 meses

Tempo de preenchimento

1 minuto

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Qualidade de vida na última semana	1	Escalas visuais
Qualidade de vida nos últimos 6 meses	2	análogas

Sistema de Pontuação

Leitura direta da escala

**Propriedades
Psicométricas**

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Reprodutibilidade (1 semana): $r=0,96$

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 9 doentes com espondilite anquilosante. Não foram registados efeitos de chão ou de teto.

**Principais
referências
bibliográficas**

Pimentel-Santos F, Pinto L, Barcelos A, Cunha I, Branco J, Ferreira PL. Portuguese version of the bath indices for ankylosing spondylitis patients: a cross-cultural adaptation and validation. *Clinical Rheumatology* 2012; 31(2):341–6.