

RMQ

Palavras Chave

Lombalgia
Lombociatalgia
Impacto da dor lombar

Tipo de Instrumento

Específicos de sinais e sintomas
Específicos de região do corpo

Autores Originais

Martin Roland
Richard Morris

Título Original **RMQ (Roland and Morris Questionnaire)**

Objectivo Medir e avaliar a incapacidade gerada por dor lombar, medir e avaliar o impacto dos cuidados de saúde efetuados por problemas lombares.

Condição de Saúde Lombalgia/lombociatalgia específica ou não específica

População Jovens, adultos e idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente ou por entrevista

Principais referências bibliográficas da v. original Roland M, Morris R. A study of the natural history of back pain: Part I: development of a reliable and sensitive measure of disability in low-back pain. *Spine*, 1983; 8(2):141-4.
Roland M, Fairbank J. The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. *Spine*, 2000; 25(24):3115-24.

Versão: Portugal

Nome da versão Questionário de Roland e Morris sobre Incapacidade

Autores da versão



João Gil
Jan Cabri
Pedro Lopes Ferreira



Condições de utilização

Número de itens 24

Janela de medida Hoje

Tempo de preenchimento 5 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

Descrição	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO 1 (assinala)
Sistema de Pontuação	As pontuações são apresentadas numa escala de orientação negativa de 0 (ausência de incapacidade) a 24 (incapacidade grave).		
Indicadores de Qualidade	<p>Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão e obtenção de uma versão de consenso. Alfa de Cronbach de 0,85 (1ª aplicação) e de 0,86 (48 horas após). Reprodutibilidade (48 h): coeficiente de Kappa de 0,58 e 0,46 nos itens 10 e 14, e entre 0,61 e 1,00 nos restantes itens; % concordância total entre 84,2% e 100%. Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 10 doentes. Validade de construção: $r=0,71$ com escala qualitativa da dor e r entre -0,37 e -0,63 com o MOS SF-36. Poder de resposta: valor padronizado de mudança de -1,09 (antes e após um processo de cuidados de fisioterapia, 4 semanas).</p>		
Principais referências bibliográficas	<p>Gil JN, Cabri J, Ferreira PL. Efectividade dos cuidados de fisioterapia em doentes ambulatoriais com problemas lombares não específicos. <i>Revista Portuguesa de Saúde Pública</i> 2009 Vol Temático(8):35-50.</p> <p>Gil JA. <i>Efectividade dos cuidados de fisioterapia em doentes ambulatoriais com problemas lombares não específicos</i>. [Dissertação]. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa; 2006.</p>		