

## SIPSO

### Palavras Chave

funcionalidade  
Acidente Vascular Cerebral  
Hemiplegia  
Integração social

### Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

### Autores Originais

Richard Trigg  
Victorine Wood

**Título Original** SIPSO (Subjective Index of Physical and Social Outcome)

**Objectivo** Medir a integração social após AVC.

**Condição de Saúde** Acidente Vascular Cerebral

**População** Indivíduos vítimas de AVC

**Modo de Preenchimento** Preenchido pelo doente

**Principais referências bibliográficas da v. original** [Trigg R, Wood VA, Hewer RL. Social Reintegration after stroke: the first stages in the development of the Subjective Index of Physical and Social Outcome. \*Clinical Rehabilitation\*, 1999; 13\(4\):341-53.](#)  
[Trigg R, Wood VA. The Subjective Index of Physical and Social Outcome \(SIPSO\): a new measure for use with stroke patients. \*Clinical Rehabilitation\*, 2000; 14\(3\) :288-99.](#)

## Versão: Portugal

**Nome da versão** Índice Subjectivo de Resultados Físicos e Sociais

**Autores da versão**



Carla Almeida  
Luís Cavalheiro



**Condições de utilização** A definir

**Número de itens** 10

**Janela de medida** Desde a ocorrência do AVC

**Tempo de preenchimento** 8 minutos

	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
<b>Descrição</b>	Física	P1-P5	0 a 4

	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
<b>Sistema de Pontuação</b>	A pontuação total é apresentada numa escala de orientação positiva de 0 (pior nível de integração) a 40 (melhor nível de integração)		
<b>Indicadores de Qualidade</b>	<b>Tradução:</b> equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão e obtenção de uma versão de consenso. <b>Alfa de Cronbach</b> de 0,95. <b>Reprodutibilidade</b> (5 dias): r entre 0,95 (dimensão social) e 0,99 (dimensão física). <b>Validade de conteúdo:</b> análise de compreensão e aceitação por painel de 9 indivíduos vítimas de AVC. <b>Validade de construção:</b> r entre 0,58 a 0,60 com escala de níveis de integração, r entre 0,34 a 0,53 com o MOS SF-12, r entre 0,73 a 0,78 com o Índice de Barthel, e r entre 0,74 a 0,86 com o Inventário Depressivo de Beck.		
<b>Principais referências bibliográficas</b>	Almeida CS. (2003). <i>Validação e Adaptação Cultural e Linguística do Subjective Index of Physical and Social Outcome (SIPSO)</i> . [Monografia]. Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra; 2003.		